

Варіанти ефективних збалансованих рецептів годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств.

Статевно-вікова група	Злакові корми				Протейнова складова				Кормовий концентрат		Мінеральна частина			Грубі корми*		Всього			
	Рпичів.	Пшениця	Злава пшениці	Кукурудза	Енц/оакс. голозерні	Макуха соняшникова (4% СП)	Шрот соняшниковий (40% СП)	Соя макуха (37% СП)	Соявий шрот (46% СП)	Сов. повнокорона електр. (2,5% СП)	Енц.	Енц. екструдований	ЖИВІНА АВМКК (гварини)	Сольний Р (соль, й)	Фосфорне борошно		Циць	Циць люцерни*	Складні корми (ферусулабелан, жовта маля, сою)*
Поросята	жива маля до 20 кг**	14	29		20					25			9	2,5		0,4			100
		59			20		10						9	2		0,4			100
		23	11		30					25			8	2,9		0,4			100
		39			25					25			8	2,9		0,4			100
		43			20			25					9	2,2		0,4			100
		17	23		18					25	5		9	3		0,4			100
		44	30				15						9	2		0,4			100
		42	21				7	16			5		8	1,5		0,4			100
		37			28		7	19					7	1,9		0,4			100
		23	10		30					25			8	3,7		0,4			100
	69								18			9	2,8		0,4				100
	20	29		20		20						9	2,4		0,4				100
	35	28							25			9	3		0,4				100
	17	33		20		10			10			8	2		0,4				100
	34	7		26			10		13			8	2		0,4				100
	49			17		10		14				8	2		0,4				100
	17	21		27				26				7	1,5		0,4				100
	55			20				15				8	2		0,4				100
	47			23		10		10				8	2		0,4				100
	10	28		20		5				17	10	8	1,9		0,4				100
42	28				20						8	2		0,4				100	
26	10		27		20					8	6,5	1,5		0,4				100	
26	29		19		16						8	1		0,6				100	
21	17		27		25						7	2,2		0,4				100	
37		4	30		20						7	1,9		0,4				100	
22	33		20				15				8	2,4		0,4				100	
19	33		20				9			8	8	2,5		0,4				100	
41			27					22			7	2,2		0,4				100	
22	33		17			9				12	5	1,7		0,7				100	
57			19		16						6	1,6		0,4				100	
21	22		29		22						6	0,4		0,4				100	
34			19	23	17						5	1,6		0,4				100	
17	35		17		17				6		6	1,4		0,4				100	
40	35				16						7	1,6		0,4				100	
19	27			22	15				10		5	1,3		0,5				100	
28	14		28		23						6	1,5		0,4				100	
17		30	28		19						5	1,4		0,4				100	
22	35		17		17						7	2		0,4				100	
16	35		22						17		7	2,2		0,4				100	
48			28				16				6	2,1		0,4				100	
22	35		17		17						7	1,6		0,4				100	
49	27				17						5	1,1		0,5				100	
19	10	18	28		18						6	1,4		0,4				100	
19		29	28		18						5	1,4		0,4				100	
35	30		11		16						6	1,8		0,4				100	
22	35		17		17						7	1,6		0,4				100	
35	30		14		16						6	1,6		0,4				100	
35	35	45	14								4	1,9	0,4					100	
75	18										4	2,2		0,4				100	
18	10		25								5	1,6		0,7		40		100	
27	39		5								5	1,6		0,7		22		100	
25				66	3						4,0	2,0		0,4				100	
41	30		13						9		4	2,5		0,4				100	
55	10										4,0	2,2		0,4		28		100	
55	35				2						5,0	1,9		0,4				100	
13	33	29		18							4,0	1,5		0,7				100	
18	10		25								5,0	1,6		0,7		40		100	
25		43	25								5,0	1,5		0,7				100	
55	36				2						4,0	2,6		0,4				100	
41	30		13						9		4,0	2,5		0,4				100	
30	50	12									6	1,9	0,4					100	
66	25										6	2,2		0,4				100	
20	30		17		2						6	1,2		0,5		24		100	
24	30				17						6	1,2		0,5		22		100	
65				26							6	2,2		0,4				100	
40	30		14		5				5		4	1,6		0,4				100	
60	10										6	1,6		0,4		22		100	
57	30								5		6	1,5		0,6				100	
28	5	15		42	3						5	1,5		0,6				100	
20	30		17		2						6	1,2		0,5		24		100	
28		45	19								6	1,5		0,7				100	
21	28		22		20						7	2,4		0,4				100	
41			17			10					6	1,1		0,5		25		100	
55	33				2						7	2,2		0,4				100	
36	35				20						7	1,4		0,6				100	
20	15		40	17							6	1,7		0,6				100	
38	30										6	1,2		0,4		24		100	
35		40	17								6	1,7		0,6				100	
44		44			4						6	2		0,4				100	
25	30		20		16						7	2		0,4				100	
15	10		41		25						7,0	1,5		0,6				100	
14	11		41		25						7,0	1,5		0,6				100	
17			23	28	8		15				7,0	2,0		0,4				100	
22	28		16		10				9	7	6,0	1,6		0,4				100	
38	28				15						7,0	2,0		0,4		10		100	
22	13		29		29					7	7,0	1,8		0,5				100	
28	19		22		22						7,0	1,3		0,5				100	
15	10		41		25						7,0	1,9		0,6				100	
14		10	41		26						7,0	1,7		0,6				100	
30	28		16						15		8,0	2,5		0,4				100	
20			41					17			8,0	1,9		0,6		11,8		100	
27		22	28		16						4	1,9		0,6				100	
24	27		20		15				7		5	1,7		0,5				100	
26		30	28		4						4	1,9		0,5		6		100	
36			17		20						5	1,3		0,5			20	100	
26	3		35		26				4		4	1,7		0,5				100	

* - згодуюється вволю по мірі споживання тваринами
 підсисним поросяттам рекомендовано екструдувати злакові корми

**

Варіанти ефективних збалансованих рецептів годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств.

Статево-вікова група		Злакові корми				Протеїнова складова					Кормовий концентрат	Мінеральна частина		Грубі корми*		Всього	
		Ячмінь	Пшениця	Вівірки пшеничні	Кукурудза	Макуха соняшникова (34% СП)	Шрот соняшниковий (40% СП)	Сосва макуха (37% СП)	Соевий шрот (46% СП)	Горох	Горох екструдований	ЖИВИНА АВМКК (тварини)	Салій Р (свині, коні, ін)	Сіль	Сіно*		Соковиті корми (кореневі, бульбоплоди, зелена маса, тощо)*
Поросята	0-2 місяці	24	19		31	10						8,0	2,3	0,3		5,0	100
	молодняк після відлучення	29	11		27	21						5,0	1,8	0,4		5,0	100
Відгодівля		19		30	28	17						5,0	1,5	0,4			100
Свиноматки	холості і супоросні	28		32	8							5,0	1,4	0,8	25,0		100
	супоросні (30 днів до опоросу)	8	6	28	22	4						5,0	1,7	0,8	25,0		100
	підсиєні	25			41	20						7,0	1,6	0,6		5,0	100

* - згодуюється вволю по мірі споживання тваринами

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статеві-вікова група	Грубі корми			Соковиті корми				Концентровані корми				Протеїнова складова				Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Інші корми		Всього						
	Сіно	Сіно лугове	Солома	Сілок	Снаж	Кукурудза консервована	Жом буряковий	Велена меча	Корінь	Дерть пшенична	Вівіа пшениці / жгті	Ячмінь	Дерть кукурудзяна	Овес	Макуха соняшкова	Шрот соняшниковий	Соя екструдована повножирна	Соява макуха	Горохова дерть	ЖИВИНА АВМКК (тварини)	Са лійд Р (лінійне сіно)		Вашнякове борошно	Сіль	Увісика цукрово-фосфорна суміш*	Лінійна дробина	Корене-бульболоди	
Молодняк ВРХ	1-2 місяці	22							35	6	10	10	30							4,0	0,7	0,3	4			100		
		11		51						18		7	11	7							3,0	1,7	0,2	2		42	100	
		17		51							10		16	10							2,3	1,6	0,2	7			100	
		13		17	51								25	2,3							2,3	0,2	0,2	5			100	
				50									18	2,3							2,3	1,6	0,2	7			100	
		21		16	42						9		16	37							5,0	1,6	0,5		25		100	
				11	54						22				4						2,3	1,4	0,3	4			100	
	3-4 місяці										20	20	16			20		18		5,0	1,0						100	
		10		3	50				37		7	10	15	18	30					4,0	0,9	0,3					100	
		20		51							8		14				7			2,3	0,4	0,1		6			100	
				20	51						21										2,3	0,2			6			100
				20	51						3	5	1								2,3	0,2	0,2		6			100
				20					70		3										0,7		0,2					100
				18	41				21		9		15	50		14					0,5	2,5	0,5			17		100
		11		18	56						5		5			6					0,7	0,5	0,3		4			100
		10		16	42						15					12	3				0,8	0,6	0,3					100
		34						6	53												0,7	0,4	0,3		4			100
	5-6 місяці										30	18	26			21				1,5	0,3	0,2		5			100	
											20	20	16			20		18		4,0	1,0	0,3					100	
		10		3	50				84		5		6	3						5,0	1,0						100	
				17					76		8	15						7			0,7	0,2	0,2		1			100
				30					60		4	1	2								2,3	0,7	0,2		5			100
											3	5	1								0,4	0,1	0,2					100
											10	77									0,7	0,2						100
	Відгодівля ВРХ																				5,0	2,3	0,5			5		100
											11	54				4				2,3	1,4	0,2		6			100	
	Дійні корови	10		8	61					9	4				3					0,7	0,5	0,3		5			100	
		28						21	44											1,8	0,3	0,2		5			100	
										30	18	26			20				5,0	1,0	0,2					100		
										15	30	27					22			4,0	1,8	0,4					100	
21			9	8						81	2	6			4					0,6	0,5	0,2		3			100	
14		58								85		5		6	1					0,5	0,3	0,2		2			100	
18		23		36						3	3	5	1	3						0,5	0,6	0,2		1		46	100	
20			15	28				19			10	5			1		4	5		1,0	0,8	0,4		6			100	
4			17	35	30					6	2	3								0,7	0,7	0,4		7			100	
23			15	48						5	4									1,0	0,7	0,3		4			100	
33				59						9			3,5							0,7	0,5	0,3		3,5			100	
				16																0,4	0,2	0,2		2			100	
10			5	56					73		3	1	4							0,6	0,5	0,3		6			100	
			5	33	17			18		15					7					0,8	0,8	0,3		5			100	
			3	25	22			19		10		7			4					0,4	0,1	0,3		1		22	100	
9			6	60						2	2	4			1					0,4	0,1	0,3		1			100	
			9	27	16			31		18					3					0,6	0,3	0,3		3			100	
49															5					0,5	0,1	0,2		2			100	
55											3	22			5					0,9	1,1	0,4		8		10	100	
23		16	3	24				17			5				11					0,8	0,3	0,3		1		9	100	
40			5	30							5	18			6					0,9	0,5	0,3		5			100	
9			6	60								14			3					0,6	0,3	0,3		7			100	
			9	27	20			31		18					3					0,6	0,3	0,3		3			100	
28			4	32				31							5					0,4	0,1	0,2		3			100	
11			5	22							8									0,8	0,1	0,2		3			100	
23		16		24											2					0,6	0,3	0,3		8		30	100	
28			4	32							10	12								0,9	0,5	0,4		5		3	100	
			2	26	22			19			2	3		3						0,8	0,1	0,3		4			100	
24				15				55							5					0,5	0,2	0,2		1		19	100	
			10	35	17			14							2			2		0,4	0,6	0,2					100	
			9	44	31					4					2			2		0,5	2,0	0,1		3	10		100	
															2					0,5	0,1	0,2		3	9		100	
															8	8				1,0	0,4	0,4		9		22	100	
			11	27	25			14			4				6					0,5	0,1	0,1		1	9		100	
												2	1							0,5	0,2	0,1			1		100	
			16	44				22		10					4					0,7	0,2	0,2		3			100	
			17	51							5	8			4					0,8	0,5	0,2		5			100	
			12	10	57						2	6	4		2					0,7	0,4	0,3		6			100	
			16	44				22							4					0,7	0,2	0,2		3			100	
			2	58							9				4					0,7	0,3	0,5		6	3		100	
		12	15	21			22	7	8					5					0,8	0,4	0,3		3		6	100		
		2	4	29	18			37		1	3			1					0,7	0,5			3			100		
Сухостійні корови	28		5	5						3	3	5	2		5				0,5	0,1	0,3		1		43	100		
	23		10	49							5	6							0,5	0,8	0,3		5			100		
	7		14	71						1	2	1							0,5	0,4	0,3		3			100		
Ремонтні телиці			12	42	23	17								2					0,5	0,9	0,3		3			100		
	ж./м. 350 кг		17	42			21		10					5						0,7	0,5	0,3		4			100	
ж./м. 400 кг		4	18	41			9		13					10					0,7	0,5	0,3		4			100		
Бики			18	41			21		9					6						0,7	0,5	0,3		4			100	
	64						70			5	3	2	3	3		7			1,5	0,5	0,5		10			100		
										15	8	37	15	15	1					1,0		0,2					100	
		6	3	69						8		3		5					2,0	2,0				6			100	
																			0,5	0,5			5			100		

* Цукрово-фосфорна суміш (цукор 40% / P 15%) - виробництва ПФ ВІТА для балансування цукрово-протеїнового, кальцій-фосфорного співвідношення.

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств.

Статево-вікова група	Грубі корми		Соковиті корми				Концентровані корми					Протеїнова складова		Кормовий концентрат	Мінеральна частина		Інші корми		Всього
	Сіно лугове+бобових трав 50/50	Солома	Зелена маса	Силос	Снаж	Жом буряковий	Зелена маса	Дерть пшенична	Вівірки пшеничні / житні	Ячмінь	Кукурудза	Овес	Макуха соняшникова	Шрот соняшковий	ЖИВИЦА АВМСК (тварини)	Салцій Р (дійне стадо)	Сіль	Меліса / цукрово-фосфорна суміш*	
Дійні кози	51	7							6	12		10		6,0	0,7	0,3	7		100
	57	5							4	16	8			4,0	0,8	0,3	5		100
	10						17		14	29		24		4,0	1,7	0,7			100
	34								14	10	14	12		5,0	0,9	0,3	5	5	100
	97													1,3	0,2	0,1	1		100

* Цукрово-фосфорна суміш (цукор 40% / Р 15%) - виробництва ПФ ВІТА для балансування цукрово-протеїнового, кальцій-фосфорного співвідношення.

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств.

Статево-вікова група	Грубі корми				Зернова частина				Протейнова складова					Кормовий концентрат	Мінеральна частина				Всього						
	Сіно люцерни	Лоптернове борошно	Борошно трав'яне	Сіно різногравя	Ячмінь	Пшениця	Кукурудза	Овес	Вівітки пшеничні	Шрот соняшниковий	Макуха сояшпикова	Макуха соєва	Шрот соєвий	Горох	Горохова дерть	ЖИВИНА АВМКК (тварини)	Са лій Р (мілкі тварини)	Вапнякове борошно		Сіль	Сухе молоко	Кров сушена	Коренець-боллоди	Зелена маса	
Кролі молодяк	25-45 днів		15		11	23	29			13	31				21	2,5			0,2	7	5			100	
			15			45					31						8	0,3	0,2	0,3					100
						35		10			31						8	0,3	0,2	0,3					100
						20	25	18			28						0	0,2	0,5	0,3					100
						22	20	18			32						8	0,3	0,2	0,3					100
	45-90 днів							12	17		32						8	0,3		0,3					100
						41		5	14		31						8	0,6		0,3					100
						36					15						4	0,1		0,3				44	100
						20			10		17						4	0,1		0,3			7	42	100
			2		18		16		20			14					7	0,1		0,3					100
			18			47		18				27					8	0,1		0,3					100
			18			35		12				27					8	0,1		0,3					100
						11	30	17				33					8	0,1	0,2	0,3					100
						21	20	18			32						8	0,3	0,2	0,3					100
						21	20	17				33					8	0,1	0,2	0,3					100
						25	26	14				27					7	0,1	0,2	0,3					100
			41					17				23					8	0,3		0,3					100
						41			14	7		32					6	0,3		0,3					100
			19		7	13	10	5	20					20			6	0,2		0,3					100
		90-120 днів					41	14	5			31						8	0,6		0,3				
					20			40		37						2	0,2		0,5					100	
					11			48		25					11	4,5	0,1	0,3	0,4			11		100	
	30				15			11	15	24						4,5	0,18		0,5				30	100	
					19			40		18						2	0,1		0,5				20	100	
	30				10			20	14	8						5	0,3	1					12	100	
								60		25					9	4	0,98	1,1	0,5					100	
				30	17		12	15			25					7	0,3		0,3			23		100	
				33	16	17			16		22			16		7	0,3		0,3		5			100	
	18				54						20					8	0,1		0,3					100	
	18				54						20					8			0,3					100	
					10	41	14				27					7	0,1	0,2	0,3					100	
					21	20	17			20						8	0,1	0,2	0,3					100	
	42						10	27			14					7	0,1		0,3					100	
					32	6	6		8		20		2	10		10		1,1	0,6					100	
				43	7		18			26					6	0,3		0,3					100		
	15		7	15	20		20					16			6	0,2		0,3					100		
Самки	сукрільні		4	27		13		37		21				9		4	1	1,08	0,5			14		100	
				26		13	17				14		8				5	0,8		0,3			42		100
				45		11	10	2	10			16					5	1		0,3					100
				5		5			41	22		21					4	1,4		0,5					100
				27					37		21				9		4	1	1,08	0,5					100
			44			35						15					5	1	0,1	0,3					100
						25		10				15					5	1	0,1	0,3					100
	холості і сукрільні					52	20				20						5	0,88	1,3	0,3					100
						27	25	19			20			2			5	0,6	1,3	0,3					100
						15	19	15			20	20					7			0,3					100
						20	13										5	1,8		0,3					100
								64			24					9		2	0,5		0,5				100
					27			37			21					9		4	1	1,1	0,5				100
			9	27		14	10		17				16				5	1,6		0,3					100
						27					11						2	0,3		0,5				59	
Лактуючі					40	30				22						7	1,1		0,3					100	
							20			58						4	0,5		0,5					100	
			30		10			11	16	26						6	0,18		0,5					100	
			15		27			24	10	18						6	0,3		0,5					100	
				17				42		24					10	6	0,6	0,5	0,4					100	
			30		25			20	12	8						5	0,1		0,5					100	
			30		24			15	5	11						5	1,1		0,6					100	
			30		25			20	5	10				7		5	2	1							100
					8			10		32						4	0,3		0,5				45		100
				17				42		24					10	6	0,5	0,58	0,4						100
		4		26		7				14						6		0,5	0,3			42			100
				30		9	13	5	10		26					6	1		0,3						100
				7		11		28	20		25					8	1		0,5						100
					23			42		24				10		0,5			0,58	0,4					100
				15		27		24	10	18						6	0,28		0,5						100
			30		10		11	16	26						6	0,18		0,5						100	
				17			42		24				10		6	0,5	0,58							100	
			42		6		8	5		30					7	0,8		0,3						100	
				50			18			25					6	1	0,1	0,3						100	
					7		10			26					6	1	0,1	0,3						100	
						40	20			30					7	0,88	1,3	0,3						100	
					13	19	15		20			24			7	0,2	1,7	0,3						100	
					27	25	19			20					5	0,5	0,9	0,3						100	
						30				20					7	1,3		0,3						100	
			7		30			5		35			</												

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств.

Статєво-вікова група	Грубі корми		Зернова частина				Протєїнова частина			Кормовий концентрат	Мінеральна частина							
	Сіно/борошно лоперни	Сіно різнотрава	Ячмінь	Пшениця	Кукурудза	Овес	Висівки пшеничні	Макуха соняшникова	Макуха соєва	Шрот соєвий	ЖИВИНА АВМКК (тварини)	Са лій Р (млікі тварини)	Вапнякове борошно (крейда корм)	Сіль	Льон	Сухе молоко	Жом буряковий	Всього
Шиншили	7		13	17		13	16	18		13	2	1						100
	25		7	5	6	5	20	10		5	5		0,4	5		5		98
			15	15	10	15	22	8			4	0,4	0,3	5	5			100
	8	18	7		10	6	19	10		7	2		0,32	8	5			100